

STODAL JARABE

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. *Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado STODAL jarabe para obtener los mejores resultados.*

- **Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.**
- **Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.**
- **Si los síntomas empeoran o persisten pasada una semana, consulte con un médico. STODAL jarabe se presenta en frasco de 200 ml.**

Las sustancias activas en cada 100g son:

Anemone pulsatilla 6 CH..... 0,95 g Rumex crispus 6 CH..... 0,95 g Bryonia dioica 3 CH..... 0,95 g Ipeca 3 CH..... 0,95 g Spongia tosta 3 CH..... 0,95 g Sticta pulmonaria 3 CH..... 0,95 g Antimonium tartaricum 6 CH... 0,95 g Myocarpe 6 CH..... 0,95 g Coccus cacti 3 CH..... 0,95 g Drosera TM..... 0,95 g Jarabe de Tolú..... 19,00 g Jarabe de Polygala..... 19,00 g

Los demás componentes son sacarosa, agua purificada, etanol, caramelo y ácido benzoico (E210).

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorios BOIRON S.I.H. Avda. Valdelaparra, 27
28108 Alcobendas, MADRID

Fabricante:

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon, FRANCIA

1- ¿QUÉ ES STODAL jarabe Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

STODAL jarabe es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en el tratamiento sintomático de la tos, laringitis, traqueitis y bronquitis.

2- ANTES DE TOMAR STODAL jarabe

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Información importante sobre alguno de sus componentes

- Cada 5 ml de STODAL jarabe contienen 3,75 g de sacarosa, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con diabetes mellitus y con intolerancia a ciertos azúcares.
 - Cada 5 ml de STODAL jarabe contienen 1,74% V/V de etanol en volumen final (0,069 g de etanol), lo que puede ser perjudicial en personas que padecen alcoholismo.
- Debe ser tenido en cuenta en mujeres embarazadas o lactantes, niños y en grupos de alto riesgo,

como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

· Por contener ácido benzoico, puede aumentar el riesgo de ictericia (coloración amarillenta de la piel) en los recién nacidos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3- ¿CÓMO TOMAR STODAL jarabe? Adultos:

De 3 a 5 cucharadas soperas (aproximadamente 15 ml) al día.

Niños:

De 3 a 5 cucharadas de café (aproximadamente 5 ml) al día.

Las tomas deben repartirse a lo largo del día y al acostarse para calmar la tos nocturna. Vía oral.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Recuerde tomar su medicamento. Si estima que la acción de STODAL jarabe es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten pasada una semana, consulte con su médico.

Si ha utilizado STODAL jarabe más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar STODAL jarabe no duplique la dosis para compensar las tomas olvidadas.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, STODAL jarabe puede tener efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5- PARA CONSERVAR STODAL jarabe

Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 30 °C .

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Mantener STODAL jarabe fuera del alcance y de la vista de los niños.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios