

LIZIPAINA[®]

Comprimidos

COMPOSICIÓN:

Un comprimido contiene:

Lisozima5 mg
Papaína2 mg
Bacitracina (D.C.I.)3 mg.

Excipientes:

Sacarina, sorbitol, esencia de menta, estearato de magnesio, c.s.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Envase con 1 tubo de 20 comprimidos.

ACTIVIDAD

Antiinfeccioso bucofaríngeo.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:

LABORATORIOS FHER, S.A.
Pablo Alcover, 31
08017 - Barcelona

Fabricante:

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
12, rue André Huet
51060 Reims Cedex (Francia)

INDICACIONES

Alivio sintomático de las afecciones leves de la garganta y de la boca:

- irritaciones de la garganta,
- pequeñas heridas leves de las encías como las producidas por dentaduras postizas,
- ronqueras y afonías.

CONTRAINDICACIONES

Niños menores de 3 años (presencia de esencia de menta).

Sensibilidad o alergia a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES

No administrar a niños menores de 6 años, sin consultar al médico.

Si los síntomas persisten más de 2 días, o se agravan, o van acompañados de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consultar al médico lo antes posible.

INTERACCIONES

Evitar la utilización simultánea con otros antisépticos bucofaríngeos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento.

ADVERTENCIAS

Advertencia sobre excipientes:

Este medicamento contiene 1,4 g de sorbitol como excipiente por comprimido. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Embarazo y lactancia:

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Uso en niños:

Ver precauciones y contraindicaciones.

Uso en ancianos:

No se dispone de información específica.
Consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción:

No se han descrito

POSOLOGÍA

Adultos:

1 comprimido disuelto en la boca, cada dos horas, hasta un máximo de 6 a 8 comprimidos al día.

Niños de 6 a 15 años:

Dosis máxima de 3 a 4 comprimidos al día.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO:

No masticarlos ni tragarlos enteros.

Dejar deshacer lentamente el comprimido en la boca.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes dosis pueden producirse molestias digestivas.

Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida, o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

Raras veces, reacciones alérgicas.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Consérvese en lugar fresco y seco, cerrando bien el tubo.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: Diciembre 1999

ABCDe

